

Beispiel für vorbeugende Maßnahmen bei Jungtauben (und Jährigen):

Tag	über das Wasser	über das Futter
Sonntag	<ul style="list-style-type: none"> • PATROCINIUM 20 Tr./Liter • ADAPTOL 1 ml/Liter • KONDITION 1 1 ml/Liter • KAMALYT PROFI 2 g/Liter 	<ul style="list-style-type: none"> • M 28 SPORT 10 g/300 g Futter • Mit MEGAFORM oder OXYPUR-KRÄUTERHEFE oder Joghurt • 3-5 Mariendistelkörner pro Taube
Montag	<ul style="list-style-type: none"> • PATROCINIUM 20 Tr./Liter • ADAPTOL 1 ml/Liter • KONDITION 1 1 ml/Liter 	<ul style="list-style-type: none"> • 3-5 Mariendistelkörner pro Taube
Dienstag	<ul style="list-style-type: none"> • PATROCINIUM 20 Tr./Liter • ADAPTOL 1 ml/Liter • KONDITION 1 1 ml/Liter 	<ul style="list-style-type: none"> • M 28 SPORT 10 g/300 g Futter • 3-5 Mariendistelkörner pro Taube
Mittwoch	<ul style="list-style-type: none"> • PATROCINIUM 20 Tr./Liter • ADAPTOL 1 ml/Liter 	<ul style="list-style-type: none"> • 3-5 Mariendistelkörner pro Taube
Donnerstag	<ul style="list-style-type: none"> • PATROCINIUM 20 Tr./Liter • ADAPTOL 1 ml/Liter • KAMALYT PROFI 2 g/Liter 	<ul style="list-style-type: none"> • M 28 SPORT 10 g/300 g Futter • 3-5 Mariendistelkörner pro Taube
Freitag	<ul style="list-style-type: none"> • PATROCINIUM 20 Tr./Liter • ADAPTOL 1 ml/Liter • KONDITION 1 1 ml/Liter 	<ul style="list-style-type: none"> • 3-5 Mariendistelkörner pro Taube
Samstag	<ul style="list-style-type: none"> • PATROCINIUM 20 Tr./Liter • ADAPTOL 1 ml/Liter 	<ul style="list-style-type: none"> • 3-5 Mariendistelkörner pro Taube

Dieser Plan ist ein sinnvoller Vorbeugungsplan für Jungtauben und basiert auf dem „Steckbrief Jungtierkrankheit“ von Dr. Warzecha. Er wird ab Anfang Juli bis zum Ende der Jungtiersaison durchgeführt.

Mit M 28 SPORT und KAMALYT PROFI beginnt man, wenn die Tauben mit dem Ziehen beginnen. Mit ADAPTOL beginnt man, wenn irgendwelche Formen von Stress beginnen. Mit dem gesamten Plan beginnt man natürlich sofort, wenn die Tauben die ersten Symptome von Jungtierkrankheit zeigen. Dieser Plan kann ebenso bei Alttauben angewendet werden, da insbesondere die Jährigen ebenfalls noch unter den im Steckbrief beschriebenen Verhältnissen leiden. Er zeigt, wie die ersten fünf dort beschriebenen Mittel angewendet werden können. Man sollte ihn nach Bedarf mit zusätzlichen Mitteln erweitern. Zum Beispiel mit einem Multivitamin (ALFAVITAM 2 ml/Liter)

am Montag oder Mittwoch, mit STABAC und HELIOS-ÖL jeweils zu M 28 SPORT hinzu, mit VIRUMUN einen Tag vor und nach dem Einsetzen, mit AC 65 von Sonntag bis Dienstag über das Wasser und VD1 von Sonntag bis Dienstag zusätzlich über das Futter.

Die weiteren stärkenden Mittel der bekannten Pläne können ebenfalls gegeben werden (ALLIUM PLUS, REGULANS, CATOSAL am Ankunftstag 10 ml/L, etc.) Mariendistelsamen sollen bis zum Mauserende gegeben werden. Dieser Plan berücksichtigt viele Faktoren um die Jungtierkrankheit herum. Er gibt keine Garantie. Das Circovirus und andere Erreger sind trotz aller Maßnahmen überall vorhanden und warten auf ihre Chancen. Der Züchter ist also auch mit einem guten Plan weiterhin gefordert und muss evtl. in Absprache mit der Praxis Untersuchungen oder kurze oder längere antibiotische Therapien durchführen und vor allem ausreichende Schon- und Erholungszeiten einplanen.